

Antibiotikatherapien nach Leitlinie

<p>Rachen- und Gaumenmandelentzündung (Tonsillitis)</p> <p>Quelle: S2K-Leitlinie Antibiotikatherapie bei HNO-Infektionen (2019)</p>	<p>1. Wahl: Penicillin V</p> <p>2. Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clindamycin • Makrolide: Roxithromycin, Azithromycin
<p>Mittelohrentzündung (akute Otitis media)</p> <p>Quelle: S2K-Leitlinie Antibiotikatherapie bei HNO-Infektionen (2019)</p>	<p>1. Wahl: Amoxicillin</p> <p>2. Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicillin + Clavulansäure • Makrolide: Roxithromycin, Azithromycin • Cephalosporine: Cefaclor, Cefuroxim-Axetil
<p>Nasennebenhöhlenentzündung (Akute Rhinosinusitis)</p> <p>Quelle: S2K-Leitlinie Antibiotikatherapie bei HNO-Infektionen AWMF-Register-Nr. 017/066 (Jahr: 2019)</p>	<p>1. Wahl: Amoxicillin</p> <p>2. Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amoxicillin + Clavulansäure • Makrolide: Roxithromycin, Azithromycin • Doxycyclin • Cephalosporine: Cefaclor, Cefuroxim-Axetil
<p>Unkomplizierte Harnwegsentzündung (Cystitis)</p> <p>Quelle: S3-Leitlinie Brennen beim Wasserlassen AWMF-Register-Nr. 053-001 (Jahr 2018)</p>	<p>1. Wahl: Pivmecillinam, Nitroxolin, Nitrofurantoin</p> <p>2. Wahl: Sulfamethoxazol + Trimethoprim (Cotrimoxazol)</p>
<p>Unkomplizierte Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)</p> <p>Quelle: S3-Leitlinie Brennen beim Wasserlassen AWMF-Register-Nr. 053-001 (2018)</p>	<p>1. Wahl: Ciprofloxacin</p> <p>2. Wahl: Cephalosporine der Gr. 3: Cefpodoximproxetil, Cefixim</p>
<p>Leichte Pneumonie ohne Komorbidität</p> <p>Quelle: S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie (2021)</p>	<p>1. Wahl: Amoxicillin</p> <p>2. Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doxycyclin • Clarithromycin • Azithromycin • Moxifloxacin • Levofloxacin (nur bei Legionellen-Antikörpern im Urin)
<p>leichte Pneumonie mit definierter, stabiler Komorbidität (schwere COPD, Herzinsuff., Bronchiektasien, PEG, Bettlägrigkeit)</p> <p>Quelle: S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie (2021)</p>	<p>1. Wahl: Amoxicillin + Clavulansäure</p> <p>2. Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moxifloxacin • Levofloxacin (nur bei Legionellen-Antikörpern im Urin)